

COVID (+) O PERSONA SOSPECHOSA PARA PROCEDIMIENTO DE ANALGESIA NEURAXIAL PARA EL TRABAJO DE PARTO:

Configurar la bomba epidural o mezcla manual fuera de la habitación:
NO lleve el carro epidural a la habitación del paciente



Cuidamos a los que cuidan

Primero:

- Preparar la mezcla y la bomba para analgesia neuroaxial fuera de la habitación
- Solicite que preparen a la paciente y abran el paquete estéril y los insumos necesarios

Equipo de protección personal fuera de la habitación:

- Siga las instrucciones paso a paso para colocarse los elementos de protección personal

En la habitación - confirme:

- Máscara facial en la paciente
- La enfermera en la habitación ya ha abierto equipo estéril
- Tiene mezcla y la bomba para analgesia neuroaxial - previamente configurada fuera

En la habitación:

- Realice el procedimiento y cuando haya finalizado retire el primer par de guantes
- Antes de retirar el equipo de protección individual: asegúrese de que el dolor se haya mejorado y no haya complicaciones
- Cuando esté listo para salir de la habitación: realice higiene de manos con los guantes puestos con alcohol glicerinado, el segundo par de guantes solo se debe retirar antes de salir
- Retire la bata dejando la parte externa hacia adentro. Realice higiene de manos con alcohol glicerinado
- Retire la protección ocular. Realice higiene de manos con alcohol glicerinado.
- Deseche todos los artículos en la caneca de residuos. Retire el segundo par de guantes
- Realice higiene de manos con alcohol glicerinado

Habitación exterior:

- Retire el gorro y la mascarilla facial evitando tocar el exterior. Realice higiene de manos con alcohol glicerinado
- Deseche todo en un contenedor de residuos clínicos
- Lávese las manos con agua y jabón